

CENTRO DE ASMA & DE ALERGIA DE LOS ROCKIES

INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA CUTÁNEA PRE

Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de llegar en las citas de prueba cutánea. Se preparan para estar en la Oficina durante varias horas de ese día. Sobre el contador y prescripción drogas pueden afectar a las pruebas cutáneas incluyendo antihistamínicos que contengan medicamentos resfriado y la alergia y ayudas de sueño, bloqueadores de histamina y algunos antidepresivos.

Los **ANTIDEPRESIVOS ISRS común como :**

CELEXA, PROZAC, PAXIL Y ZOLOFT -QUE NO DEBA SUSPENDERSE.

INTERRUMPIR

Antihistamínico corta actuación que contengan drogas 48 HORAS ANTERIOR A LA PRUEBA:

Azatadine (Optimine, Trinalin)

Bromofeniramina (Bromfed, Bromphen, Cophene-B, Dallery JR, Dimetapp Allergy Liqui-gel, productos Lordane, Nasahist B, productos de Poly-Histine, Rondec, Ultrabrom productos)

Clorfenamina (Aller-Chlor, productos Atrohist, Chlor-Trimeton, DA Duravent, Extendryl, Kronofed, Nolamine, Ornade Spansule, Pediacare Allergy fórmula, Respar-A.R.M., Sudafed fría y alergia, Sinutab Sinus Allergy, Teldrin, Tylenol Cold y productos de alergia)

Clemastina (12 Horas alergia de contacto, productos de Tavist)

Ciproheptadina (Periactin)

Dexchlorpheniramine (Dexchlor, Polaramine)

Dimenhidrinato (X calma, Dinat, Dramamine, Dramanate, hídrico, Triptone Caplets)

Difenhidramina (AllerMax Caplets, Benadryl, Compoz, Diphen tos, Diphenhist, Dormarex 2, Genahist, Hyrexin, Nervine Nighttime Sleep-ayuda, Nytol, Siladryl, Sleep-Eze D, Sominex, Twilite Caplets, Tylenol Cold y productos de alergia, intensidad máxima de la SleepGels de ONUSOM)

Doxilamina (Tylenol la gripe Nighttime, ONUSOM Nighttime Sleep Aid)

Fenindamina (Nolahist, Nolamine, productos de Poly-Histine, productos de Triaminic)

Tripelennamine (Torneo, torneo-SR, Pelamine)

INTERRUMPIR

Drogas de reflujo ácido/estómago (bloqueadores de histamina) 48 HORAS ANTERIOR A LA PRUEBA:

Nizatidina (Axid), **famotidina** (Pepcid), **ranitidina** (Zantac), **cimetidina** (Tagamet)

INTERRUMPIR

Actuando ya los antihistamínicos 5 A 7 DÍAS ANTERIOR A LA PRUEBA:

Allegra productos (5 días)

Astelin aerosol nasal (7 días)

Astepro aerosol nasal (7 días)

Claritin/Clarinet productos (5 días)

Zyrtec productos (7 días)

Xyzal productos (7 días)

Productos de **Alavert** (7 días)

Patanase aerosol nasal (7 días)

DESCONTINUAR SÓLO SI INSTRUIDO POR EL MÉDICO

Otras drogas incluyendo ciertos antidepresivos y ansiolíticos agentes 5 A 7 días antes a los tests:

Hidroxicina Amitriptylene (Atarax, Vistaril) **Trazadone**

Amoxapine imipramina (Tofranil) **trimipramina** (Surmontil) **Maprotinine clomipramina** **Xanax**

Desipramina nortriptilina **Seroquel**

Doxepina (Sinequan) **Protriptylene** (Vivactil)

Se lleva a cabo pruebas de alergia al rascarse líquidos antígenos en la espalda del paciente, permitiendo, a continuación, a 15 minutos para una reacción que se produzca. Esta reacción es una protuberancia de mosquitos-like que varía en tamaño y enrojecimiento. El tamaño de la reacción determina si será necesaria otra prueba. Una pequeña cantidad de alérgeno se inyecta en los brazos de aquellos que no mostraron reacciones en la parte posterior. El tamaño de las reacciones ayuda al médico a determinar las alergias del paciente y su nivel de sensibilidad, que se analizará una vez finalizada la prueba.

